

INFORMACJA DLA PACJENTA

PRZED WYKONANIEM BADANIA: TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA(TK) lub REZONANS MAGNETYCZNY (MR)

Data i godzina badania.....

1. Informacja dla pacjentów wykonujących badanie TK / MR bez i z kontrastem:

W związku z zapisami Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r., w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. M.Z. 2015. 78), **prosimy o przedłożenie pełnej dokumentacji medycznej związanej ze schorzeniem, którego dotyczy badanie TK / MR, tj. poprzednie wyniki TK / MR, USG, RTG (płyty, klisze, opisy), karty informacyjne leczenia szpitalnego, itp.**

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostarczenia ww. dokumentacji, w dniu badania lub do 48 godzin od dnia wykonania badania, jego opis nie będzie zawierał analizy porównawczej przedmiotowego schorzenia.

2. Informacja dla pacjentów wykonujących badanie TK / MR z kontrastem:

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Do badania należy się zgłosić z aktualnym wynikiem poziomu **kreatyniny** (i/lub oznaczonym współczynnikiem GFR we krwi) nie starszym niż 30 dni.

UWAGA !!! Jeśli poziom kreatyniny będzie podwyższony (GFR obniżony), Pacjent zgłasza się do lekarza kierującego lub lekarza POZ z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie badania. W przeciwnym wypadku Pracownia odstąpi od badania do czasu uregulowania poziomu kreatyniny.

Pacjenci z **chorobami tarczycy** muszą wykonać badanie na poziom **TSH – dotyczy badania TK.**

W dniu badania proszę zażyć o godzinie 6.00 rano leki obecnie stosowane i popić wodą niegazowaną.

3 dni przed i 3 dni po badaniu proszę pić po 3 litry niegazowanych płynów dziennie.

W DNIU BADANIA NA CZCZO!!! (2 godziny przed badaniem nie pić, 6 godz. przed badaniem nic nie jeść, nie żuć gumy, nie palić papierosów).

UWAGA PACJENCI Z CUKRZYCĄ WYKONUJĄCY BADANIE TK: dzień przed badaniem, w dniu badania oraz dwa dni po badaniu nie wolno przyjmować leków zawierających METFORMINĘ (np. SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METFORMAX i inne). Pozostałe leki przyjmować wg zaleceń lekarza.