

Załącznik nr 5 do Instrukcji QI-1/LA-05 - Instrukcja dla lekarza i pacjenta o zasadach prawidłowego przygotowania do badań laboratoryjnych

Zasady pobierania próbki moczu do badania ogólnego:

- Oddawanie moczu musi być poprzedzone umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej za pomocą wody i mydła, bez wycierania (dopuszczalne jest wycieranie ręcznikiem jednorazowym), nie stosować środków odkażających.
- Mocz pobierany jest ze środkowego strumienia, tj. po odrzuceniu pierwszej porcji kolejną ilość 50 – 100ml zebrać do jednorazowego naczynia, resztę odrzucić.
- Naczynie jednorazowego użytku, przeznaczone specjalnie do pozyskiwania moczu musi być szczelnie zamknięte i w prawidłowy sposób opisane: imię, nazwisko, data i godzina pobrania. Próbkę jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.
- Do pobierania moczu u noworodków i dzieci stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą. Okolice narządów płciowych i odbytu dziecka należy umyć wodą i mydłem, a następnie umieścić woreczek wokół sromu lub penisa dociskając taśmę klejącą do krocza. Zawartość woreczka należy sprawdzać co 10 – 15 minut. Nie należy przelewać lecz wypełniony woreczek dostarczyć do laboratorium.